

**MENTIONS DE DANGER**

- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CONSEILS DE PRUDENCE**

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'incinération agréée.



**Avertissement  
Waarschuwing  
Warnung**

**GEVARENAANDUIDINGEN**

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Gelekte / gemorste stof opruimen.
- Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**GEFAHRENHINWEISE**

- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**VORSICHTSMAßNAHMEN**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Beim Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt / Behälter in einer zugelassenen Verbrennungsanlage zuführen.



**Accent®**  
**HERBICIDE**

GROUPE / GROEP

B

HERBICIDE



**Herbicide anti-graminée et anti-dicotylée de post-  
émergence en maïs.**

**Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van grassen  
en breedbladige onkruiden in maïs.**

Numéro d'agrégation / Erkenningsnummer:  
9626P/B (Belgique / Belgie)

Numéro d'agrégation: L01836-051(Luxembourg)  
Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 75% de  
nicosulfuron.

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 75%  
nicosulfuron.

© Marque déposée de / Gedeponoord handelsmerk van  
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**Contenu/Inhoud: 100 g e**

**Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.**

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre  
contact avec le centre DUCHEM HELP: tel. 00.352/3666.6543 ou  
avec le Centre Anti-Poisons, tel. 070/245.245.

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.**  
In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP  
centrum: tel. 00.31.78/630.1899 of met het Antigifcentrum: tel. 070/245.245.

**STOCKAGE** : Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

**OPSLAG** : In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinoystraat 6 - 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415

Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk

K-38021/31412 - BELGIUM/LUXEMBOURG



**Numéro de lot / Lotnummer :**  
**Date de production / Productiedatum :**

**CYAN MAGENTA JAUNE NOIR**



**MENTIONS DE DANGER**

- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CONSEILS DE PRUDENCE**

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'incinération agréée.



**Avertissement  
Waarschuwing  
Warnung**

**GEVARENAANDUIDINGEN**

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Gelekte / gemorste stof opruimen.
- Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**GEFAHRENHINWEISE**

- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**VORSICHTSMAßNAHMEN**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Beim Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt / Behälter in einer zugelassenen Verbrennungsanlage zuführen.



**Accent®**  
**HERBICIDE**

**GROUPE / GROEP**

**B**

**HERBICIDE**



**Herbicide anti-graminée et anti-dicotylée de post-  
émergence en maïs.**

**Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van grassen  
en breedbladige onkruiden in maïs.**

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer:  
9626P/B (Belgique / België)

Numéro d'agrément: L01836-051 (Luxembourg)  
Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 75% de  
nicosulfuron.

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 75%  
nicosulfuron.

© Marque déposée de / Gedeponerd handelsmerk van  
E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**Contenu/Inhoud: 100 g e**

**Respectez les instructions d'utilisation pour  
éviter les risques pour la santé humaine et  
l'environnement.**

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre  
contact avec le centre DUCHEM HELP: tel. 00.352/3666.6543 ou  
avec le Centre Anti-Poisons, tel. 070/245.245.

**Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de  
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.**  
In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP  
centrum: tel. 00.31.78/630.1899 of met het Antigifcentrum: tel. 070/245.245.

**STOCKAGE** : Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

**OPSLAG** : In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.

Antoon Spinostraat 6 - 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415


Fabriqué en France / Gefabriceerd in Frankrijk



K-38021/31412 - BELGIUM/LUXEMBOURG

**CYAN MAGENTA JAUNE NOIR**





Herbicide anti-graminée et anti-dicotylée de post-émergence en maïs.

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer: 9626P/B (Belgique / Belgique)

Numéro d'agrément: L01836-051(Luxembourg)

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 75% de nicosulfuron.

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre contact avec le centre DUCHEM HELP : tel. **00.352/3666.6543** ou avec le Centre Anti-Poisons, tel. **070/245.245**.

**Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.**

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6 - 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415

#### MENTIONS DE DANGER

- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu / récipient dans une usine d'incinération agréée.



Avertissement

#### AUTRES MENTIONS

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de nicosulfuron/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du nicosulfuron ne peut pas dépasser 45g/ha/12 mois.
- Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
- Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non-traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).

NOIR

**STOCKAGE**

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

**DESTRUCTION EMBALLAGE VIDE**

Vider complètement l'emballage et rincer à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi.



[www.phytofarrecover.eu](http://www.phytofarrecover.eu)

L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (Phytofar-Recover).

**UTILISATION AUTORISEE**Prescription d'emploi

Est uniquement autorisé pour l'emploi en tant qu'herbicide dans la culture de maïs (sauf maïs doux).

Délai ultime d'utilisation avant la récolte

Voir le dernier stade d'utilisation pour l'emploi.

Mesures anti-dérive

Respecter une zone tampon de 20 mètres avec technique classique.

*Seulement pour Luxembourg:*

Zone tampon: Respecter une distance d'au moins 5 m entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau.

Le produit est toxique pour les plantes aquatiques.

Le produit est toxique pour les organismes aquatiques.

Le produit n'est pas toxique pour les abeilles.

Produit destiné à un usage professionnel.



## MODE D'EMPLOI

### GÉNÉRALITÉS

#### Mode d'action

ACCENT® est un herbicide systémique qui est très rapidement absorbé, principalement par le feuillage des adventices. La croissance des mauvaises herbes est déjà stoppée quelques heures après la pulvérisation.

Par la suite, des symptômes de décoloration et de nécroses apparaissent et se traduisent par la disparition des adventices. La vitesse de destruction des adventices est dépendante de l'espèce et du développement de celles-ci.

ACCENT® est très rapidement dégradé dans le sol et n'a de ce fait aucune rémanence. Dans le cas d'une levée irrégulière des mauvaises herbes, il est parfois nécessaire de traiter une seconde fois.

#### Conditions avant et après le traitement

ACCENT® doit être appliqué sur une végétation sèche et saine.

L'effet de ACCENT® est raisonnable dépend des conditions climatiques:

- Appliquer à des températures comprises entre 10° et 25°C.  
Après une période de temps froid (moins de 10°C) avec de la pluie, il est nécessaire d'attendre que le maïs ait récupéré et que la cuticule soit reformée.  
Quand on s'attend à une période de températures élevées il est conseillé d'ajourner le traitement, afin d'assurer une période de températures modérées (inférieures à 25°C) quelques jours après l'application.
- Ne s'applique pas si le gel est attendu.
- 3 heures sans pluie après l'application est suffisante.

- Si dans les 24 heures après l'application prévue de fortes précipitations est attendue, l'application soit différée.

#### REMARQUE:

Il est recommandé que ACCENT® ne s'applique pas à une culture en mauvais état en raison de:

- a. Des conditions climatiques défavorables, notamment:
    - alternance de gel et de dégel;
    - de grandes fluctuations de température entre le jour et la nuit;
    - une tempête de grêle;
    - une forte lumière.
  - b. une pénurie ou l'abondance de l'eau;
  - c. une maladie ou de dégâts des ravageurs;
  - d. un manque de nutriments;
- ou autres facteurs de croissance qui affectent gravement les cultures.

### MAUVAISES HERBES

#### Spectre d'action

ACCENT® détruit un grand nombre de mauvaises herbes dicotylées et graminées. La meilleure efficacité sera obtenue si l'on traite des adventices jeunes en pleine croissance. Il est important de bien toucher les mauvaises herbes. Lors de repousses ou de nouvelles levées un second traitement peut être nécessaire.

Dans le tableau suivant, vous trouverez une série d'adventices ainsi que leur sensibilité. Pour d'autres adventices, consultez votre négociant.

**NOIR**  


S	MS	NS
<b><i>MAUVAISES HERBES</i></b>		
Amarante Armoise Bident tripartite Colza Capselle Fumeterre Ortie royale Gaillet Lamier Mercuriale Renouée feuilles patience Renouée persicaire Ravenelle Pourpier Seneçon Sené Laiteron Mouron Tabouret Pensée	Chardons Liserons Datura stramoine Tournesol Mente Renouée liseron Epière des champs Lampourde	Chénopode Prêle Renouée des oiseaux Morelle noire Véronique fe de lierre

S	MS	NS
<b><i>GRAMINÉES</i></b>		
Chiendent Vulpin Avoine Repousses de céréales Panic Ray-grass Sétaire Sorgho Paturin	Digitaire glabre Digitaire sanguine	

S = sensible MS = moyennement sensible NS = non sensible

Lors de la présence de mauvaises herbes qui sont peu sensibles ou moyennement sensibles, il est préférable de rajouter un herbicide approprié.

Stade de mauvaises herbes

Le produit doit être utilisé quand les mauvaises herbes sont encore à un stade jeune et en pleine croissance. En général le stade optimal est: cotylédons jusque y compris 4 feuilles.

## APPLICATIONS

### En général

ACCENT® doit être pulvérisé de façon homogène. Il est nécessaire d'avoir un pulvérisateur en bon état de marche afin d'éviter des surdosages sur les zones ne devant pas être traitées.

### Adjuvants

Pour obtenir une bonne efficacité d'ACCENT® il faut toujours ajouter 100 ml TREND® 90 par 100 litres d'eau. Cela peut provoquer de la mousse, être prudent lors du remplissage. Dans la majorité des cas, il y a un mouillant dans la formulation d'un partenaire de mélange. Consultez votre conseiller.

### Nombre d'application et intervalle d'application

Il est permis de faire au maximum 1 application par hectare par 12 mois au printemps.

### Volume d'eau

ACCENT® peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-400 litres à l'hectare. En présence d'une culture très drue, il est conseillé de l'appliquer avec le plus grand volume d'eau afin de toucher correctement les adventices.

## **MAIS ENSILAGE ET MAIS GRAIN**

NE PAS utiliser en maïs doux, maïs sous plastic ou dans la production de semences ou de lignées variétales

### Stade de la culture

ACCENT® peut être utilisé du stade deux vraies feuilles jusqu'au stade 8 feuilles de la culture (BBCH 12-18).

### Variétés

ACCENT® peut être utilisé sur toutes les variétés de maïs. Certaines variétés sont sensibles.

### Usage

ACCENT® peut servir de base pour le désherbage de postémurgence du maïs pour détruire des mauvaises herbes telles que les graminées et les dicotylées comme par exemple camomille, chiendent, mouron, etc. Afin d'obtenir un spectre aussi large que possible, ACCENT® s'utilisera en général en mélange avec d'autres herbicides (voir aussi "mélanges").

### Dose

#### *Graminées annuelles*

1 application de 0,06 kg/ha + 100 ml TREND® 90 (9002P/B, L01550-051)/100 l d'eau.

#### *Cotylées annuelles*

Contre la plupart des dicotylées, à l'exception de *Chenopodium album*, *Solanum nigrum* et *Polygonum aviculare*: 1 application de 0,06 kg/ha + 100 ml TREND® 90 (9002P/B, L01550-051)/100 l d'eau.

Pour lutter contre *Chenopodium album*, *Solanum nigrum* et *Polygonum aviculare*, le produit sera appliqué à la dose de 0,05 kg/ha + 100 ml TREND® 90 (9002P/B, L01550-051)/100 l d'eau, en mélange avec un herbicide antidicotylées agréé complémentaire (à base de mésotrione, sulcotrione ou bromoxynil).

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses. La diminution de la



dose, appliqué n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

#### PRÉPARATION DE LA BOUILLIE DE PULVÉRISATION

- Commencer avec un pulvérisateur propre;
- Remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Ajouter la quantité nécessaire de produit et mettre le système d'agitation en marche;
- Continuer à remplir la cuve avec de l'eau;
- Pendant la pulvérisation, laisser le système d'agitation en marche;
- Les emballages doivent être vidés correctement, rincés à l'eau, et l'eau de rinçage doit retourner dans la cuve de pulvérisation.

#### ATTENTION :

**Ne jamais verser les surplus dans les égouts !**

Fermer hermétiquement l'emballage conformément aux dispositions légales régionales.

Ne préparez pas plus de bouillie de pulvérisation que nécessaire.

#### MELANGES

ACCENT® ne peut pas être mélangé avec :

- Huile minérale;
- Produits à base de bentazon ou de fluroxypyr;
- Organo-phosphorés.

#### ATTENTION :

Entre une application d'ACCENT® et celle des produits précités, il est nécessaire de garder un intervalle de 7 jours.

#### SURPLUS DE TRAITEMENT

Le surplus de pulvérisation sera dilué dans plus ou moins dix fois son volume d'eau et sera pulvérisé sur la parcelle juste traitée, selon les prescriptions d'emploi.

Pour éviter ces surplus de pulvérisation la quantité nécessaire de produit à pulvériser sera calculée avec précision en fonction de la surface de la parcelle et du débit par hectare de la machine.

#### NETTOYAGE DU MATERIEL DE PULVERISATION

Il est très important et c'est une bonne pratique agricole de bien nettoyer l'appareil de pulvérisation directement après le traitement.

1. Remplir la cuve à moitié d'eau;
2. Rajouter 0,5 l d'ALL CLEAR EXTRA™ par 100 litres d'eau et continuer à remplir avec de l'eau;
3. Mettre le système d'agitation en marche et laisser agir pendant une dizaine de minutes;
4. Ensuite pulvériser le mélange sur la parcelle venant d'être traitée;
5. Démontez les filtres et jets et les nettoyez soigneusement à l'ALL CLEAR EXTRA™
6. Finalement rincer complètement la machine (cuve, rampe, conduites et jets) avec de l'eau claire;
7. Répéter la procédure ci-dessus encore 1 fois.

#### ATTENTION :

Eviter la pollution de toute eau de surface (étangs, fossés, etc...) et surtout celle qui est destinée à l'irrigation des cultures.







### RESISTANCE

ACCENT® contient une seule matière active: nicosulfuron. Cette molécule appartient à la famille des sulfonylurées. L'action est obtenue par le blocage de l'enzyme ALS (acéto lactate synthétase).

Lorsque des herbicides ayant le même mode d'action sont utilisés consécutivement pendant plusieurs années pour contrôler les mêmes espèces d'adventices dans le même champs, alors des biotypes résistants, naturellement présents dans la population, peuvent survivre et devenir résistants dans cette parcelle.

Pour éviter que le phénomène ci-dessus se produise très rapidement, il est très important que l'utilisateur :

- dans la culture de l'année: mélange ou alterne ACCENT® avec des produits ou des mélanges de produits à mode d'action différent. Il est fortement conseillé d'effectuer au maximum 2 traitements avec des produits ayant le même mode d'action que l'ACCENT®.
- dans la rotation: utilise sur une même parcelle et au fil des cultures mises en place des herbicides à mode d'action différent.
- suive le mode d'emploi comme celui décrit sur l'étiquette, en tenant compte de la dose, de l'intervalle de pulvérisation et de la période optimale de pulvérisation.

La présence possible d'une résistance ne peut pas être prévue. Consultez votre conseiller pour les recommandations au sujet de la gestion de la résistance.

### CULTURES SUIVANTES

Après l'utilisation de ACCENT®, les cultures suivantes peuvent être implantées:

### Après labour

- Après 4 mois : céréales d'hiver
- Après 8 mois : céréales d'froment
- Après 10 mois : toutes les cultures annuelles

### Culture de remplacement

En cas d'échec culture, seule maïs peut être implantée.

### ATTENTION:

- En raison d'un manque d'information suffisante, il est déconseillé de planter des arbres, des cultures ornementales ou des pépinières dans les 16 mois suivant le traitement avec l'ACCENT®.
- Ces recommandations ne tiennent pas compte des autres herbicides que la parcelle aurait reçu durant la même année (consulter les firmes en question ou DuPont).

### PRECAUTIONS VIS-À-VIS DES DERIVES

Toute dérive de bouillie de pulvérisation, vers une étendue d'eau (mares ou étangs) ou une culture voisine présente ou à planter, doit être évitée. La floraison des cultures comme le sucre, les légumineuses, les viols et les légumes sont très sensibles au médicament.

Veillez pulvériser par temps calme.



**INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS****Symptômes**

Bien que ce produit ne soit pas classé comme dangereux pour la santé, des symptômes d'intoxications peuvent survenir en cas d'utilisation anormale ou d'ingestion accidentelle.

**Inhalation :** Maintenir la victime calme et l'emmener à l'air frais. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

**Ingestion :** Rincer la bouche. Faire boire un peu d'eau. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

**Contact avec la peau :** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

**Projection dans les yeux :** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245.**


**IMPORTANT**

Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur cette étiquette et qu'il est destiné aux applications reprises sur l'étiquette et seulement lorsqu'il est utilisé en accord avec les recommandations d'emploi dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie, ni expresse, ni impliquée.

Fabriqué en France

® Marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**NOIR**



Herbicide voor de na-opkomstbestrijding van grassen en breedbladige onkruiden in maïs.

Erkenningsnummer: 9626P/B (Belgique / Belgie)

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 75% nicosulfuron.

### **Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.**

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum: tel. **00.31.78/ 630.1899** of met het Antigifcentrum: tel. **070/245.245**.

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A. Antoon Spinoystraat 6 - 2800 Mechelen - Tel.: 0032 475/415.415

#### **GEVARENAANDUIDINGEN**

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### **VOORZORGSMAATREGELEN**

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Voorkom lozing in het milieu.
- Gelekte / gemorste stof opruimen.
- Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.



**Waarschuwing**

#### **ANDERE VERMELDINGEN**

- Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
- Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid nicosulfuron/ha aangebracht door dit product of andere producten die nicosulfuron bevatten niet hoger zijn dan 45g/ha/12 maanden.
- Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
- Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).



**NOIR**





## OPSLAG

In originele goed gesloten verpakking bewaren.

## VERNIETIGEN VAN DE LEGE VERPAKKING

De verpakking volledig ledigen en met water spoelen door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden en verspoten volgens de gebruiksaanwijzing.

De aldus gespoelde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden, maar moet volgens de wettelijke regionale voorschriften afgevoerd worden (Phytofar-Recover).



[www.phytofarrecover.eu](http://www.phytofarrecover.eu)

## TOEGESTAAN GEBRUIK

### Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als herbicide in de teelt van maïs (behalve suikermaïs).

### Uiterste gebruikstijdstippen voor de oogst

Zie laatste toepassingstadium van het gebruik.

### Driftreducerende maatregelen

Respecteer een bufferzone van 20 meter met klassieke techniek.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### **ALGEMEEN**

#### Werking

ACCENT® is een systemisch herbicide en wordt snel, voornamelijk via het blad van de onkruiden, opgenomen. De groei van de gevoelige onkruiden wordt al na enkele uren volledig stop gezet, waardoor er geen concurrentie meer is met het gewas. Verkleurings- en necrosesymptomen verschijnen en geven enkele weken later aanleiding tot het afsterven van de onkruiden. De snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden van de onkruiden.

ACCENT® wordt snel in de bodem afgebroken en heeft daarom geen nawerking. In geval van een gespreide opkomst van de onkruiden kan het nodig zijn een tweede behandeling uit te voeren.

#### Omstandigheden tijdens en na de toepassing

ACCENT® dient te worden toegepast op een droog en gezond gewas.



CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



De werking van ACCENT® is redelijk afhankelijk van de weersomstandigheden:

- Toepassen vanaf 10°C tot 25°C.

Na een koude periode (minder dan 10 °C) met voortdurende neerslag dient te worden gewacht met de toepassing tot de maisplanten zijn hersteld en een waslaag hebben gevormd.

Het is van belang een periode van gematigde temperaturen de dagen na de toepassing te hebben (lager dan 25°C). Wanneer enkele dagen met hoge temperaturen worden verwacht is het aan te raden de behandeling uit te stellen.

- Niet toepassen wanneer nachtvorst wordt verwacht.
- 3 uur zonder regen na de toepassing is voldoende.
- Als binnen 24 uur na de geplande toepassing zware neerslag wordt verwacht, moet de toepassing worden uitgesteld.

#### LET OP:

Het wordt aanbevolen om ACCENT® niet toe te passen op een gewas dat in een slechte conditie verkeert als gevolg van:

- a. Ongunstige weersomstandigheden, zoals:
    - afwisselend vorst en dooi;
    - grote schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur;
    - een hagelbui;
    - sterk zonlicht.
  - b. een tekort of overvloed aan water;
  - c. een ziekte- of plaagaantasting;
  - d. een tekort aan voedingsstoffen;
- of andere factoren welke de groei van het gewas negatief kunnen beïnvloeden.

#### **ONKRUIDEN**

##### Werkingspectrum

ACCENT® bestrijdt een groot aantal grassen en tweezaadlobbige onkruiden. De beste en de breedste werking wordt bekomen indien ACCENT® wordt toegepast op jonge en actief groeiende onkruiden. Het is belangrijk de onkruiden goed te raken. Bij hergroei en/of nieuwe opkomst kan een herbehandeling noodzakelijk zijn.

In de volgende tabel staan een aantal onkruiden en hun gevoeligheid. Voor overige onkruiden raadpleeg uw leverancier.



G	MG	OG
<b><i>BREEDBLADIGE ONKRUIDEN</i></b>		
papegaaiekruid alsem ambrosia akkerscherm driedelig tandzaad koolzaad herderstasje zandkool duivekervel hennepnetel kleefkruid dovenetel bingelkruid duizendknoop perzikkruid knopherik rapistrum kruiskruid herik melkdistel muur witte krodde akkerviool	distel soorten winde soorten doornappel zonnebloemen munt soorten zwaluw tong akkerandoorn stekelnoot	melde soorten heermoes varkensgras zwarte nachtschade klimopereprijs

G	MG	OG
<b><i>GRASSEN</i></b>		
kweek duist haver opslag graan hanepoot raaigrassen naalbaar sorghum straatgras	vingergras gierst	

G = zeer gevoelig      MG = matig gevoelig      OG = ongevoelig

Bij aanwezigheid van onkruiden die ongevoelig (OG) of matig gevoelig (MG) zijn, verdient het aanbeveling om een daartoe geschikt herbicide toe te voegen.

#### Stadium onkruiden

Het middel dient te worden toegepast als de onkruiden zich in een jong stadium bevinden en actief groeien. In het algemeen geldt als optimale stadium: kiemblad tot en met 4-blad stadium.



## TOEPASSINGEN

### Algemeen

ACCENT® moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

### Uitvloeier

Voor een goede werking van ACCENT® moet altijd 100 ml TREND® 90 per 100 liter water worden toegevoegd. Dit kan enige schuimvorming veroorzaken, wees daarom voorzichtig met vullen.

In veel gevallen zit echter al een uitvloeier in de formulering van de mengpartner. Raadpleeg uw leverancier.

### Aantal toepassingen en toepassingsinterval

Het is toegestaan in totaal maximaal 1 toepassing per hectare per 12 maanden uit te voeren in de lente.

### Waterhoeveelheid

ACCENT® kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha. Bij een zeer dicht gewas is het aan te bevelen het hoogste watervolume te gebruiken om de onkruiden voldoende te raken.

### **SNIJ- en KORRELMAIS**

**NIET** toepassen in SUIKERMAIS, teelt onder plastic en bij de teelt voor zaadproductie en inteeltlijnen.

### Gewasstadium

ACCENT® kan toegepast worden vanaf het 2-blad stadium – het 8-blad stadium van het gewas (BBCH 12 - 18).

### Ras

ACCENT® kan veilig worden toegepast in alle maïsrassen. Sommige maïsrassen zijn echter gevoeliger voor dit product dan andere.

### Gebruik

ACCENT® kan dienen als basis van de na-opkomst bestrijding van een aantal moeilijk te bestrijden grassen of onkruiden, zoals kweek, hanepoot, kamille, etc. Om een zo breed mogelijk werkingsspectrum te bekomen, kan ACCENT® ingezet worden in combinatie met andere herbiciden (zie ook 'mengingen').

### Dosis

#### *Eenjarige grasachtige onkruiden*

1 toepassing van 0,06 kg/ha + 100 ml TREND® 90 (9002P/B, L01550-051)/100 l water.

#### *Eenjarige tweezaadlobbige onkruiden*

Tegen de meeste tweezaadlobbigen, met uitzondering van *Chenopodium album*, *Solanum nigrum* en *Polygonum aviculare*: 1 toepassing van 0,06 kg/ha + 100 ml TREND® 90 (9002P/B, L01550-051)/100 l water.

Voor de bestrijding van *Chenopodium album*, *Solanum nigrum* en *Polygonum aviculare* moet het product worden toegepast aan een dosis van 0,05 kg/ha + 100 ml TREND® 90





(9002P/B, L01550-051)/100 l water, in menging met een complementair erkend herbicide tegen tweezaadlobbigen (op basis van mesotrione, sulcotrione of bromoxynil).

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

#### VOORBEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

#### LET OP:

#### **Overschotten nooit in de riolering gieten!**

De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren.

Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk;

#### MENGINGEN

ACCENT® kan niet gemengd worden met:

- Minerale olie;
- Middelen op basis van bentazon of fluoroxypry;
- Organische fosforverbindingen.

#### LET OP:

Tussen een toepassing van ACCENT® en de genoemde producten moet minimaal een periode van 7 dagen aanwezig zijn.

#### BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

#### SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARatuur

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

1. Vul de tank halfvol met water;
2. Voeg daaraan 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA™ per 100 liter water toe en vul de tank verder;







3. Het roersysteem in werking stellen en een 10-tal minuten laten werken;
4. Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
5. De spuitdoppen en filters demonteren en grondig reinigen met ALL CLEAR EXTRA™;
6. Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen;
7. Herhaal bovenstaande procedure nog éénmaal.

**LET OP:**

Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater (meren, grachten, enz....) en zeker deze die voor irrigatie van culturen in aanmerking komen.

**RESISTENTIE**

ACCENT® bevat één active stof: nicosulfuron. Dit molecuul behoort tot de chemische familie van sulfonylurea. De werking wordt verkregen door de blokkering van het enzym ALS (aceto lactate synthase).

Wanneer herbiciden met dezelfde werkwijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten onkruiden te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die natuurlijk aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van ACCENT® afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende

werkwijze. Het wordt ten zeerste aanbevolen om maximaal op 2 spuitmomenten producten toe te passen met dezelfde werkwijze als ACCENT®.

- in de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de teeltrotatie, herbiciden met verschillende werkwijze.
- de gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

**VOLGGEWASSEN**

Na de toepassing van ACCENT® kunnen de volgende gewassen geteeld worden:

**Na ploegen:**

- na 4 maanden: wintergranen
- na 8 maanden: zomergranen
- na 10 maanden: alle andere gewassen

**Vervanggewassen**

In geval van mislukking van het gewas kan alleen snij- of korrelmais worden geteeld.

**LET OP:**

- Bij gebrek aan voldoende informatie wordt afgeraden groente-gewassen, bloemen, sierplanten, bloembollen, heesters of bomen te telen binnen 16 maanden na de toepassing van ACCENT®.





- Deze aanbevelingen houden geen rekening met eventueel andere herbiciden die in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel werden toegepast (betrokken firma of DuPont raadplegen).

#### DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen. Tweezaadlobbige gewassen zoals suikerbieten, peulvruchten, koolzaad en groentegewassen zijn zeer gevoelig voor het middel. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.



#### EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

##### Symptomen

Alhoewel het product niet ingedeeld is als gevaarlijk voor de gezondheid, kunnen vergiftigingsverschijnselen zich voordoen bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname.

**Inademen:** het slachtoffer rustig houden en in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking

**Inslikken:** Spoel de mond. Geef wat water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking

**Huid:** Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

**Ogen:** Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangetast oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **Het Antigifcentrum 070/245.245.**



**BELANGRIJK**

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.



Gefabriceerd in Frankrijk

® Gedeponeerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**NOIR**

